

MESSA A DIMORA DI UN PRATO FIORITO

STOCCAGGIO DELLE SEMENTI

Le sementi devono essere stoccate in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dai roditori. Se conservate in queste condizioni la qualità del miscuglio non si altererà.

PREPARAZIONE DEL SUOLO

All'atto della semina il suolo deve presentarsi pulito per ridurre il rischio di competizione; effettuare quindi un trattamento con diserbante totale (se permesso secondo PAN) o utilizzare mezzi meccanici o a base di calore (come Ripagreen) per rimuovere le infestanti. Attendere 7-8 giorni prima di procedere con i lavori. Lavorare il suolo ad una profondità di 15 - 20 cm e modellare il terreno.

In caso di presenza massiccia di infestanti, di un terreno abbandonato da tempo e in ogni caso per avere ottimi risultati, si consiglia di applicare la tecnica della falsa semina per 2-3 volte.

FALSA SEMINA

Preparare il suolo come per effettuare una semina. Lasciare germinare naturalmente le infestanti presenti o stimolarne la germinazione con irrigazioni. Attendere da 3 a 6 settimane e quindi procedere con un diserbo chimico o meccanico. Effettuare la semina del miscuglio fiorito, se possibile senza ritoccare il suolo e rullare. In caso di diserbo chimico aspettare almeno 4-5 gg prima della nuova semina. Se il suolo risulta indurito in superficie, limitarsi a una lavorazione molto superficiale a 1-2 cm di profondità così da non permettere alle sementi infestanti di posizionarsi in livelli del terreno più adatti alla germinazione.



SEMINA

Seminare alla dose raccomandata effettuando 2 passaggi incrociati. Tenendo conto della bassa dose di semina, è consigliata la miscela del miscuglio con un supporto neutro (sabbia, terriccio). Coprire leggermente la superficie e rullare il suolo in modo da assicurare il contatto seme-terreno. Per facilitare la germinazione irrigare con pioggia fine (circa 5 mm al giorno, giusto per inumidire il suolo e mantenere l'umidità in superficie), fino alla nascita delle prime foglie. Evitare ruscellamenti.

Periodi di semina consigliati per miscugli ornamentali Primavera: da metà marzo a fine aprile. Se c'è disponibilità di irrigazione, il periodo si può estendere fino a fine maggio. I miscugli fioriti di piante perenni si svilupperanno in modo completo la primavera successiva. Autunno: da inizio settembre a fine ottobre. Effettuando la semina in Autunno, la fioritura sarà al suo massimo splendore la primavera successiva. La semina autunnale è fortemente consigliata per risultati duraturi e con minor presenza di infestanti.

Periodi di semina consigliati per miscugli selvatici La semina autunnale è sempre da preferire per questi miscugli, sia per ridurre la competizione con le infestanti che per la necessità di vernalizzazione di alcune specie. Data la loro resistenza, questo tipo di miscugli può però essere seminato generalmente da metà febbraio a fine giugno e da settembre a dicembre.

MANUTENZIONE

Lasciare crescere le piante fino a che vanno a maturazione così da garantire la risemina naturale delle specie biennali e pluriennali. È consigliato effettuare la prima falciatura in inverno, dopo che le piante sono entrate in dormienza. Si può scegliere di non falciare fino a poco prima dell'inizio della stagione vegetativa lasciando così un prato dall'aspetto più naturale anche durante la stagione invernale e permettendo a insetti e piccoli roditori della zona di avere un rifugio per la stagione fredda. Il taglio in estate è solitamente sconsigliato ma si può procedere, indicativamente a inizio agosto, nel caso in cui l'aspetto del miscuglio fiorito risulti meno appagante esteticamente o lo sviluppo della vegetazione sia troppo importante. Se possibile, irrigare il prato fiorito durante i periodi estivi più siccitosi per garantirsi una fioritura più completa.